Go-South Bull. (2014), **11**, 37-45

Observations ornithologiques dans l'Oriental marocain, novembre 2013

Benoit MAIRE [(1)], Alain MATHURIN [(2)], Sabine ZEGRES [(3)] & Karim LAÏDI [(4)]

[(1)] 16 rue Ain Harrouda – Casablanca (Maroc)
bmaire@live.fr

[(2)] 22 résidence Faouzi – El Harhoura, Témara (Maroc)
alainmathurin@hotmail.com

[(3)] 64 rue de Provins, angle Bd. Emile Zola – Casablanca (Maroc)
sabinezegres@hotmail.com

[(4)] 4 Boulevard de Londres – Casablanca (Maroc)
k.laidi@eos.ma

Disponible en ligne (Available online): 27 avril 2014

Située à l'extrême sud-est du Royaume, les régions des Hauts Plateaux et de l'Atlas saharien s'étalent sur plusieurs centaines de milliers de km^2. Coincées entre le Moyen Atlas à l'ouest, la frontière algérienne fermée à l'est et le désert algérien au sud, elles ne sont sillonnées que de trois ou quatre routes asphaltées et de guère plus de pistes principales. Elles intègrent le vaste plateau du Rekkam (altitude moyenne 1500 m), balayé par les vents et couronné d'une prairie d'alfa sur des centaines de kilomètres.

Ces régions excentrées des zones touristiques ornithologiques traditionnelles ne sont que peu visitées des ornithologues[1] : on va dans l'Oriental, on ne fait pas qu'y passer… Un cul de sac, sec, d'altitude : c'est sur cette idée reçue que nous nous étions motivés depuis quelques mois à monter une expédition dans ces régions reculées, que nous n'avions pas encore explorées : nous y avons fait une excursion début novembre 2013 et cette note relate nos principales observations.

1 novembre

- Environs boisés de Boulemane au **pied du Jbel Tichoukt**, un massif isolé du Moyen Atlas (32°21'46'' N / 04°43'30'' W). Pluviers guignards (*Charadrius morinellus*) en vol. Buse féroce (*Buteo rufinus cirtensis*), Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*), Pigeon biset (*Columba livia*), Pic épeiche (*Dendrocopos major*), Cochevis huppé (*Galerida cristata*) et de Thékla (*Galerida theklae*), Grive draine (*Turdus viscivorus*), Mésange noire (*Periparus ater*), Mésange charbonnière (*Parus major*), Roitelet à triple bandeau (*Regulus ignicapilla*), Geai des chênes (*Garrulus glandarius*), Grand corbeau (*Corvus corax*), Moineau soulcie (*Petronia petronia*), Bec croisé des sapins (*Loxia curvirostra*), Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*), Bruant proyer (*Emberiza calandra*). Un Renard roux (*Vulpes vulpes*) sur une piste de nuit.

2 novembre

- Grandes plaines autour du **village d'Enjil** (33°11'11'' N / 04°33'09'' W) : Outarde houbara (*Chlamydotis undulata*), Pluviers guignard, Ganga unibande (*Pterocles orientalis*), Sirli de Dupont (*Chersophilus duponti*).

[1] Voir p. ex. les travaux de Heim de Balsac (1928), Smith (1968), Bergier (2004), Bergier *et al.* (2005) ou Liéron e*t al.* (2007) pour l'Atlas saharien et ses environs, les immenses contributions de Brosset dans les années 1960, en partie résumées dans sa thèse (Brosset 1961) et ceux des équipes de l'ECW sur l'Outarde houbara.

© 2014 Go-South, all rights reserved.
ISSN 2269-9694

- Petit **lac de barrage de Aït Karmouss**, sur la R503 peu après Boulemane (33°14'20'' N / 04°39'33'' W) : grosse concentration de 500 Tadornes casarcas (*Tadorna ferruginea*), Canards pilets (*Anas a*cuta), Canards souchets (*Anas clypeata*), Sarcelles d'hiver (*Anas crecca*).

3 novembre

- **Bouarfa** : un Faucon de Barbarie (*Falco pelegrinoides*) perché face à l'hôtel fond sur une Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) qu'il emporte difficilement sur un pylône, où il la plume.
- **Piste de Bel Ghiata**. Peu après la sortie de Bouarfa sur la route d'Errachidia, nous empruntons une piste à droite indiquée Bel Ghiata (32°31'25'' N / 2°00'10'' W). Cette bonne piste en remblai longeant le sud d'un massif montagneux est accessible à tous véhicules.

  Diverses zones buissonneuses favorables aux passereaux sont prospectées : Moineaux espagnols (*Passer hispaniolensis*) avec nombreux nids dans les jujubiers, Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*), Rougequeue de Moussier (*Phoenicurus moussieri*), Pie-grièche du désert (*Lanius elegans*), Fauvette passerinette (*Sylvia cantillans*). Gangas couronnés (*Pterocles coronatus*) dans le lit d'un oued.

  Les espèces typiques des milieux désertiques incluent Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura*) et isabelline (*Ammomanes deserti*), Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*), Traquet du désert (*Oenanthe deserti*), Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*), Cochevis de Thékla, Cochevis à long bec (*Galerida macrorhyncha*), Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*), et Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*). Nous sommes étonnés par le grand nombre d'Alouettes de Clotbey (*Rhamphocoris clotbey*). Une Hirondelle isabelline (*Ptyonoprogne fuligula*).

  En arrivant au bout de la piste en remblai (40 km environ), nous trouvons une mosquée et un fort abandonnés au pied d'un col dans le massif montagneux. A proximité, une source alimentant un ruisseau a permis le développement d'une petite oasis boisée d'eucalyptus et de tamaris, un milieu exceptionnellement attractif pour les passereaux migrateurs. Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*), Grive musicienne (*Turdus philomelos*), Bergeronnette grise (*Motacilla alba*), Rousserolle effarvatte (*Acrocephalus scirpaceus*), Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*), Pipit farlouse (*Anthus pratensis*), Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*), Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*), Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*), et le premier Pouillot à grands sourcils (*Phylloscopus inornatus*) du voyage, longuement observé dans les frondaisons d'un eucalyptus en fleurs.

4 novembre

- **Bouarfa**, réveil matinal. Le Faucon de barbarie est toujours sur son pylône mais ses tentatives d'attaques sur les tourterelles sont infructueuses. Sur la route vers Figuig, Faucon lanier (*Falco biarmicus*), Buse féroce (*Buteo rufinus cirtensis*), Corbeau brun (*Corvus ruficolis*).
- Nous nous rendons directement à un petit barrage collinaire au lieu dit **Raknat Naam** ('le coin des autruches' en arabe) sur la route de Figuig, au niveau du croisement avec la route d'Ich (32°27'10'' N / 1°41'36'' W à 25 km de Bouarfa environ). Magnifique ballet des différentes espèces de gangas venant s'abreuver : Ganga cata (*Pterocles alchata*), Ganga tacheté (*Pterocles senegallus*), et Ganga unibande (*Pterocles orientalis*). Arrivée d'un vol de 40 Tadornes casarcas. Un couple de Faucons laniers est posé au sol, attendant une occasion propice. Bergeronnette grise, une Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) isolée, Bruant proyer (*Emberiza calandra*), Corbeau brun, Moineau espagnol et Linotte mélodieuse (*Carduelis canabina*).

© 2014 Go-South, all rights reserved.

Pterocles senegallus, Raknat Naam, 4 novembre 2013 (Photo B. Maire)

Pterocles orientalis, Raknat Naam, 4 novembre 2013 (Photo B. Maire)

© 2014 Go-South, all rights reserved.

- **Km 'Figuig 90'** : deux pistachiers avec quelques jujubiers à gauche de la route : Pouillot véloce, Pie-grièche du désert, plumée d'Outarde houbara.
- **Km 'Figuig 88'** : bouquet de pistachiers à droite de la route : Rougequeue noir, Grive musicienne, Buse féroce, Moineau espagnol, Huppe fasciée (*Upupa epops*), Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*), Traquet du désert, Faucon lanier, Pie-grièche du désert, Cochevis à long bec, Cochevis de Thékla, Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*), Pouillot véloce et Corbeau brun.

Un bosquet de pistachiers de l'Atlas entre Bouarfa et Figuig, 4 novembre 2013 (Photo B. Maire)

- Un peu plus loin, à gauche, nous prenons la **piste indiquée Dayet Lahjal** (Daya des perdrix). La piste est accessible aux véhicules de tourisme à cette saison. Nous décidons de prospecter systématiquement les bosquets de pistachiers de l'Atlas et de jujubiers bordant cette piste qui constituent des îlots de verdure attractifs pour les oiseaux en migration au milieu du désert. Ils correspondent à de petites dépressions inondées en période de pluie.

© 2014 Go-South, all rights reserved.



- Bosquet 1 : Tourterelle turque, Pouillot véloce, Fauvette à lunette (*Sylvia conspicillata*), Pie grièche du désert, Rougequeue à front blanc.
- Bosquet 2 : un Grand duc ascalaphe (*Bubo ascalaphus*) s'envole d'un pistachier et se repose bien en vue dans un autre. Fauvette à lunettes et Verdier d'Europe.
- Bosquet 3 : un gros oiseau nocturne s'envole brutalement d'un arbre pour se reposer dans un autre : un Hibou des marais (*Asio flammeus*) ! Nous observons également Rougequeue noir, Pouillot véloce, Pie-grièche du désert et Traquet du désert.
- Bosquet 4 : Rougequeue de Moussier, Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*), Roselin githagine, Ganga unibande, Pie-grièche du désert, Cochevis de Thékla et Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*).

- Nous continuons ensuite la route jusqu'à Figuig : Faucon lanier, Faucon crécerelle, Pouillot véloce, Rougequeue de Moussier, Fauvette à lunette, Tourterelle turque, Alouette de Clotbey, Pie-grièche du désert et Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*).

Près de Figuig, 4 novembre 2013 (Photo B. Maire)

© 2014 Go-South, all rights reserved.

5 novembre

- Après une nuit à l'hôtel Figuig, nous nous arrêtons au km 14 sur la route de Bouarfa au bord d'un petit oued en eau bordé de palmiers dattiers et de lauriers roses. Tourterelle turque, Rougequeue noir, Pouillot véloce, Grive musicienne, Merle noir (*Turdus merula*), Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*), Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*), Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*), Aigrette garzette (*Egretta gazetta*), Moineau espagnol, Traquet à tête blanche et Bergeronnette grise. C'est à cet endroit que nous observons une étonnante concentration de Pouillots à grands sourcils : trois individus sur un parcours de quelques centaines de mètres.

  Dans les profondeurs d'un massif de laurier roses, Alain entend et observe un probable Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*). Nous essaierons vainement de le photographier.

- Nous prenons la route vers le nord et nous nous arrêtons pour camper à l'abri du vent dans un bosquet de pistachiers à **50 km au sud d'Aïn Béni Mathar**. Moineau espagnol, Pouillot véloce, Rougequeue noir, Rougequeue à front blanc, Traquet motteux, Rougegorge familier (*Erithacus rubecula*), Bergeronnette grise, Pipit farlouse, Grive musicienne, Fauvette passerinette, Verdier d'Europe, Pouillot véloce, Pouillot ibérique (*Phylloscopus ibericus*), Faucon lanier, Cochevis de Thékla, Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*), Pie-grièche du désert, Ganga unibande.

6 novembre

- Nous reprenons la route en direction d'Aïn Béni Mathar : Alouettes bilophes et de Clotbey, Alouettes calandre (*Melanocorypha calandra*), Bergeronnette grise.

- Peu après, nous prenons une route à gauche indiquée **Borj Oglat Sedra**. Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) près d'une flaque d'eau. Après quelques kilomètres, nous atteignons un fort colonial abandonné, dominant la vallée de l'oued Charef (33°42'09''N / 02°07'40''W). Belle zone de cultures irriguées en milieu désertique. Un petit bois de pins d'Alep grouille de Pouillots véloces. Parmi eux, un Pouillot à grands sourcils !

  Nous observons aussi Gobemouche gris (*Muscicapa striata*), Rougequeue noir, Bergeronnette grise et Grive musicienne.

- Nous remontons la **vallée de l'Oued Charef** vers le nord en direction d'Aïn Béni Mathar (piste 4x4). De nombreuses petites zones cultivées en bord d'oued constituent des zones attractives pour Alouette des champs (*Alauda arvensis*), Traquet motteux, Alouette calandre, Cochevis huppé et à long bec, Courvite isabelle.

© 2014 Go-South, all rights reserved.

- Plus loin, dans la steppe à alfa, nous verrons Alouette bilophe, Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*), Alouette calandre, Sirli du désert, Sirli de Dupont, Faucon crécerelle et Pie bavarde (*Pica pica mauretanica*).

Un nombre record d'observations de Pouillots à grands sourcils

Cinq données de Pouillots à grands sourcils entre les 2 et 6 novembre 2013 dans la région de Bouarfa-Figuig, c'est presqu'autant que les six données automnales connues jusqu'en 2012 :

- 13 novembre 1988, vallée de Tamrakht près d'Immouzer Ida-Ou-Tanane (S. Dybkajaer, S. Sorensen *et al. in* Thévenot *et al.* 2003)
- 21-26 octobre 1994, Estuaire de l'Oued Massa (C. Bowden, P. Holt *in* Bergier *et al.* 1996, Thévenot *et al.* 2003)
- 5 novembre 2005, vallée de Tamrakht (A.V. Harding *et al. in* Bergier *et al.* 2007)
- 19 novembre 2005 : Embouchure de l'Oued Souss (T. Kolaas *in* Bergier *et al.* 2007)
- 23 novembre 2005 : Kasbah Derkaoua (T. Kolaas *in* Bergier *et al.* 2007)
- 29 octobre 2012 : Agadir (D. Walsh *in* Bergier *et al.* 2014)

Par ailleurs, seules deux données de printemps ont été enregistrées sur la station de baguage de Merzouga, café Yasmina en avril/mai entre 2006 et 2012.

Il est intéressant de remarquer que toutes les données enregistrées au Maroc l'ont été au sud de l'Atlas sur une écharpe nord-est / sud-ouest qui se prolonge jusqu'aux Îles Canaries, où par exemple 29 oiseaux ont été détectés sur Lanzarote en hiver 2013 ! (García Vargas & Sagardía Pradera 2014).

Alors, avons-nous trouvé une zone où hivernerait le Pouillot à grand sourcils au Maroc, ou ces observations s'inscrivent-elles dans le flux particulièrement important de cet automne 2013 constaté partout en Europe ? Reste à retourner prospecter cette région en hiver…

Habitat du Pouillot à grands sourcils près de Figuig, 5 novembre 2013 (Photo B. Maire)

© 2014 Go-South, all rights reserved.

© 2014 Go-South, all rights reserved.

Bibliographie

Bergier, P. 2004. Observations de Mai 2004 dans le sud marocain. *Go-South Bull.* 1 : 18-22.

Bergier, P. ; Qninba, A. & Thévenot, M.2005. La reproduction de quelques oiseaux dans le sud marocain en 2004. *Go-Souh Bull.* 2 : 11-16.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Schollaert, V. ; Thévenot, M. & CHM 1996. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 1. *Porphyrio* 8 : 151-158.

Bergier, P. ; Franchimont, J. ; Thévenot, M. & CHM 2007. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 12. *Go-South Bulletin* 4 : 77-97.

Bergier, P. ; Franchimont, J. & CHM 2014. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 19. *Go-South Bulletin* 11 : 1-13.

Brosset, A. 1961. Ecologie des oiseaux du Maroc Oriental. *Trav. Inst. Sci. Chérifien, sér. Zool.* 22: 1-150.

García Vargas, F.J. & Sagardía Pradera, J. 2014. El influx de mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus en Lanzarote (islas Canarias) durante el otoño-invierno 2013-2014. Disponible en ligne sur www.reservoirbirds.com/Articles/RBAR_000013.pdf

Heim de Balsac, H. 1928. Exploration ornithologique dans le Sud Oranais et le Maroc oriental. *Rev. franç. Orn.* 20: 174-188, 227-237, 279-286.

Liéron, V. ; Fontaine, O. ; Caron, S. ; Le Nuz, E. ; Orhant, N. ; Rautureau, P. & Hingrat, Y. 2007. Contribution à la connaissance de l'avifaune de l'Oriental marocain. Notes sur quelques espèces caractéristiques des steppes. *Go-South Bull.* 4 : 1-5.

Smith, K.D. 1968. Spring migration through southeast Morocco. *Ibis* 110: 452-492.

Thévenot, M. ; Vernon, R. & Bergier, P. 2003. *The Birds of Morocco. An annotated Checklist*. BOU Checklist No. 20. British Ornithologists´ Union and British Ornithologists´ Club.

© 2014 Go-South, all rights reserved.