

Observations de Mai 2004 dans le sud marocain

Patrick BERGIER

Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.ifrance.com/go-south pbergier@yahoo.fr

Notre voyage de Mai 2004 dans le sud marocain a comporté deux grandes étapes. La première a consisté en une exploration du SIBE (Site d'Intérêt Biologique et Ecologique) du Jbel Grouz dans le sud-est saharien¹, qui s'étale sur plus d'une centaine de kilomètres entre Mengoub et Figuig ; trois zones y ont été plus particulièrement prospectées :

- Mengoub station et Ras el Jdid dans la partie occidentale du Jbel (5-6 Mai).
- Les environs du poste militaire d'Ajifa dans la partie orientale (7 Mai)
- La zone d'Aïn Tanzara, au centre, le 8 Mai.

La deuxième partie de notre voyage nous a ramené de Figuig à Agadir à travers le sud-est saharien (Figuig – Errachidia – Erfoud), le Tafilalt (Erfoud – Merzouga), les flancs sud des Jbels Ougnat et Sarhro entre Rissani et Agdz, le Jbel Bani (Foum Zguid – Tata), l'Anti-Atlas (Tata – Igherm – Taliouine) et enfin la plaine du Souss.

Le climat ne fut pas représentatif d'un mois de Mai normal ; de fortes précipitations se sont abattues sur une bonne partie du pays et, au sud de l'Atlas, les températures sont restées fraîches pour la saison.

De larges invasions d'acridiens ont touché tout le sud du Maroc, avec de grosses concentrations observées dans la région de Bouarfa – Figuig, le sud du Jbel Sarhro et le Jbel Bani. Les traitements par épandage aérien (une compagnie australienne spécialisée) et terrestre nous ont semblé bien dérisoires par rapport à l'ampleur du phénomène...

Pour l'anecdote, les poteaux téléphoniques, magnifiques perchoirs des régions désertiques qui étaient la providence des rapaces et des ornithologues, disparaissent peu à peu et servent maintenant de combustible... Miracle du téléphone cellulaire qui s'est répandu dans tout le Maroc.

150 espèces ont été contactées mais nous n'avons listé ci-après que les observations jugées dignes d'intérêt. L'annexe 1 présente les données de reproduction enregistrées.

¹ En compagnie de Abdeljebbar Qniba, Mohamed Fennane et Mohammed Ibn Tatou de l'Institut Scientifique (Rabat), Philippe Geniez et Michel Thévenot de l'Ecole Pratique des Hautes études (Montpellier), et Erik Mahé, coordinateur du projet.




Figure 1. Le trajet parcouru

Bubulcus ibis Héron garde-bœufs

Encore un à Merzouga le 10 Mai et un sur l'Oued El Maleh à Tissint le 13 Mai.

Egretta garzetta Aigrette garzette

Encore quelques-unes dans les régions prédésertiques, maximum 5 sur l'Oued El Maleh à Tissint le 13 Mai.

Ardea cinerea Héron cendré

Quelques-uns dans les régions prédésertiques, maximum 3 sur l'Oued El Maleh à Tissint le 13 Mai.

Platalea leucorodia Spatule blanche

Une à Merzouga le 10 Mai ; 8 sur le barrage d'Imi el Kheng, Souss, le 16 Mai.

Tadorna ferruginea Tadorne casarca

Reproducteur sur un petit barrage collinaire entre Bouarfa et Figuig, ainsi qu'à Merzouga.

Pernis apivorus Bondrée apivore

Belle migration à une trentaine de kilomètres à l'Est d'Errachidia le 4 Mai au soir, quand des dizaines d'oiseaux se posent au sol ou sur des buissons de cette région désertique pour attendre les conditions plus favorables du lendemain.

Milvus migrans **Milan noir**

Rassemblement de 18 oiseaux près de Tafinegoult, Souss, le 16 Mai.

Neophron percnopterus **Percnoptère d'Égypte**

Une seule mention d'un adulte le 5 Mai près de Bouarfa. L'espèce a quasiment disparu du pays.

Circus aeruginosus **Busard des roseaux**

Un migrateur à Mengoub le 6 Mai.

Aquila chrysaetos **Aigle royal**

Un oiseau dans la partie occidentale du Jbel Grouz (Ras el Jdid) le 6 Mai, puis un immature à Akka Iguern dans le Bani le 13 Mai.

Hieraaetus fasciatus **Aigle de Bonelli**

Un adulte dans la partie centrale du Jbel Grouz (Aïn Tanzara, 1420 mètres) le 8 Mai.

Falco pelegrinoides **Faucon de Barbarie**

Un le 7 Mai à Ajifa, Jbel Grouz.

Fulica atra **Foule macroule**

Encore une à Merzouga le 10 Mai ; 18 sur le barrage de Taghdout près de Tazenakht le 12 Mai.

Chlamydotis undulata **Outarde houbara**

Présente dans la région du Jbel Grouz.

Cursorius cursor **Courvite isabelle**

Commun dans les régions de Bouanane - Bouarfa - Figuig.

Echassiers

Un petit barrage collinaire à 26 km de Bouarfa sur la route de Figuig abritait une Aigrette garzette, un Bécasseau cocorli, une dizaine de Chevaliers guignettes et gambettes, une trentaine de Petits Gravelots et une Guifette noire le 9 Mai. Un couple de Tadornes casarcas était suivi de 5 jeunes de 2-3 semaines.

Charadrius dubius **Petit Gravelot**

En régions prédésertiques, reproducteur sur l'Oued Bouanane à Bouanane, sur l'Oued Zguid à 29 km au sud de Tazenakht, sur l'Oued el Maleh (Tissint) entre Tissint et Mrhimima, et sur un petit oued à une quinzaine de kilomètres de Tata en direction d'Akka.

Charadrius alexandrinus **Gravelot à collier interrompu**

Reproducteur sur un petit barrage collinaire entre Bouarfa et Figuig, et probablement à Merzouga.

Calidris alpina **Bécasseau variable**

Deux sur un petit oued à une quinzaine de kilomètres de Tata en direction d'Akka le 13 Mai.

Pteroclididae

Trois espèces sont présentes dans la partie occidentale du Jbel Grouz : le Ganga couronné, le Ganga tacheté et le Ganga unibande.

Streptopelia decaocto **Tourterelle turque**

Reproductrice en plein reg : un nid de deux œufs sur un acacia dans le fond de l'Oued Quabrinnouche entre Alnif et Tazzarine, flanc sud du Jbel Sarhro, le 11 Mai.

Elle n'a toujours pas colonisé l'Anti-Atlas, la dernière sur le flanc sud étant notée au village d'Issafen (+ 82 km de l'embranchement Tata - Akka / Igherm).

Streptopelia turtur **Tourterelle des bois**

Reproductrice dans les bétoums de la région de Bouarfa.

Streptopelia senegalensis **Tourterelle maillée**

Commune dans le sud-est saharien, à Bouarfa et Figuig.

Commune dans tout le Bani ; dans la vallée de l'Oued Zguid, monte jusqu'à 29 km en aval de Tazenakht.

Sur le flanc sud de l'Anti-Atlas, présente dans la palmeraie de Tagmoute au nord de Tata. Entre Tata et Igherm, entendue dans la palmeraie de Tizgui Ida Ou Baloul, à + 65 km de l'embranchement Tata - Akka / Igherm.

Bubo bubo **Grand-duc ascalaphe**

Près de Tata en Octobre dernier, nous avons trouvé morts les deux adultes d'un couple bien connu. Le territoire est à nouveau occupé, et la nichée a pu s'envoler mais un nouvel adulte est trouvé mort près de la falaise.

Strix aluco **Chouette hulotte**

Présente dans les palmeraies de la région d'Alnif, Sarhro (M. Ihmadi comm. pers.)

Caprimulgus europaeus **Engoulevent d'Europe**

Passages notés dans la région de Bouarfa - Figuig.

Caprimulgus ruficollis **Engoulevent à collier roux**

Passages notés dans la région de Bouarfa - Figuig.

Caprimulgus aegyptius **Engoulevent d'Égypte**

Commun dans la région de Bouarfa - Figuig.

Apus apus **Martinet noir**

Petits passages communément noté du 5 au 8 Mai dans les régions de Bouarfa - Figuig.

Rhamphocoris clotbey **Alouette de Clotbey**

Assez bien répandue dans les régions de Bouarfa - Figuig.

Chersophilus duponti **Sirli de Dupont**

Probablement bien répandu sur les vastes plateaux steppiques près du Tizi-n-Taghatine, Anti-Atlas central (3 chanteurs au niveau de la limite des provinces Taroudant - Ouarzazate le 16 Mai avant l'aube).

Calandrella brachydactyla **Alouette calandrelle**

Excellente année pour cette alouette qui a été trouvée commune et localement abondante dans

de nombreuses régions du sud du pays..... Quelques couples se reproduisent dans la partie centrale du Jbel Grouz (Aïn Tanzara, 1420 mètres).

***Ptyognoprogne fuligula* Hirondelle isabelline**

Deux adultes dans les jardins de l'hôtel 'Climat du Maroc' à Bouarfa le 5 Mai, et un couple nourrissant ses 3 jeunes volants au Jbel Ari Aira, entre Bouarfa et Figuig le 9 Mai. Le nid avait été construit sous le tablier d'un pont de la route. Il s'agit à notre connaissance du troisième cas concret de reproduction connu au Maroc, et le premier dans le sud-est du pays.



***Anthus campestris* Pipit rousseline**

4-5 couples reproducteurs dans la partie centrale du Jbel Grouz (Aïn Tanzara, 1420 mètres).

***Motacilla flava* Bergeronnette printanière**

Reproductrice sur l'Oued el Maleh (Tissint) entre Tissint et Mrhimima.

***Motacilla cinerea* Bergeronnette des ruisseaux**

Un ou deux oiseaux dans des gorges avec un peu d'eau courante à 33 km d'Igherm en allant vers Taliouine, Anti-Atlas central, le 15 Mai.

***Saxicola rubetra* Tarier des prés**

Un près de Mengoub le 6 Mai et un dans la palmeraie de Figuig le 9 Mai.

***Oenanthe* sp. Traquets**

Dans l'Atlas saharien (région de Bouarfa – Figuig ; Jbel Grouz), c'est le Traquet du désert *Oenanthe deserti* qui domine en nombre, suivi du Traquet à tête blanche *O. leucopyga* ; les Traquets oreillard *O. hispanica* (Aïn Tanzara, 8 Mai), à tête grise *O. moesta* (Aïn Tanzara, 8 Mai), deuil *O. lugens* (Ras el Jdid, 6 Mai) et rieur *O. leucura* (Ajifa 1 couple, 7 Mai ; Aïn Tanzara 2-3 couples, 8 Mai) sont beaucoup plus rares.

***Oenanthe hispanica* Traquet oreillard**

Assez commun dans l'Anti-Atlas entre Igherm et Taliouine.

***Oenanthe leucopyga* Traquet à tête blanche**

Près de Tata, un oiseau nourrissant une nichée à peine sortie du nid à la tête complètement noire (13 Mai).

***Oenanthe leucura* Traquet rieur**

Dans la vallée de l'Oued Zguid, au sud de Tazenakht, le Traquet rieur descend jusqu'à la Zaouiat Sidi Blal (+27 km) et le Traquet à tête blanche apparaît à + 29 km.

Sur le flanc sud de l'Anti-Atlas, entre Tata et Igherm, le Traquet à tête blanche monte jusqu'au niveau du village d'Issafen (+ 82 km de l'embranchement Tata – Akka / Igherm) ; le Traquet rieur apparaît au village de Timkite, à + 85 km : il n'y a apparemment pas de recouvrement des deux espèces.

***Cettia cetti* Bouscarle de Cetti**

Nous ne l'avons pas retrouvée dans la palmeraie d'Akka Iguirene (Jbel Bani) : l'oiseau entendu le 21 Octobre 2003 (Bergier 2004) devait être erratique.

***Scotocerca inquieta* Dromaïque du désert**

Une famille d'une demi-douzaine d'individus le 7 Mai à Ajifa, Jbel Grouz.

***Hippolais opaca* Hypolaïs obscure**

Gros passages migratoires dans tout le sud marocain, avec par exemple des dizaines d'oiseaux dans un jardin à Tamsahlate près de Tazzarine le 11 Mai.

***Hippolais pallida* Hypolaïs pâle**

Un oiseau longuement observé à Mengoub station le 6 Mai ; également notée dans la palmeraie de Figuig le 9 Mai.

***Hippolais polyglotta* Hypolaïs polyglotte**

Petits passages dans tout le sud-est et le sud marocain.

***Sylvia conspicillata* Fauvette à lunettes**

Très commune cette année dans tout le sud marocain, de la région de Figuig jusqu'au Souss. Se reproduit jusqu'à 1450 mètres au moins dans le Jbel Grouz.

***Sylvia deserti* Fauvette naine**

Un jeune volant à peine, nourri par les parents, dans un fond d'oued arénacé avec touffes d'alfa, *Ferula cotoniana* et *Zyla macroptera*, à Ras el Jdid, terminaison occidentale du Jbel Grouz, le 6 Mai.

***Sylvia borin* Fauvette des jardins**

Deux à Tazzarine le 11 Mai et une au barrage de Taghdout le 12 Mai.

***Phylloscopus bonelli* Pouillot de Bonelli**

Quelques migrateurs dans la région de Bouarfa les 6-7 Mai.

***Phylloscopus trochilus* Pouillot fitis**

Quelques migrateurs dans la région de Bouarfa les 6-7 Mai, et dans le sud Sarhro le 11 Mai.

***Muscicapa striata* Gobemouche gris**

Petite migration dans le sud-est marocain.

Ficedula hypoleuca **Gobemouche noir**

Petite migration dans le sud-est marocain.

Turdoides fulvus **Cratérope fauve**

Observé à Mengoub station, dans l'Oued Zelmou près de Bouanane, et à Tazzarine.

43 km à l'ouest d'Alnif, Sarhro, un nid dans un acacia le 11 Mai. L'un des jeunes, emplumé, est mort, s'étant attaché une patte à l'arbre par un fil plastique issu du nid. Les adultes alarment.

Parus (caeruleus) ultramarinus **Mésange (bleue) maghrébine**

Présente dans la palmeraie de Souk Tleta de Tagmoute sur le flanc sud de l'Anti-Atlas le 14 Mai.

Parus major **Mésange charbonnière**

Un couple près du village de Tagadirt, sur le flanc sud de l'Anti-Atlas à une dizaine de kilomètres en aval d'Igherm vers Tata.

Oriolus oriolus **Loriot d'Europe**

Un chanteur dans l'arganeraie à 19 km à l'Ouest de Taliouine le 16 Mai. Il n'y a que très peu de mentions en période de reproduction dans le Souss et les zones limitrophes.

Lanius meridionalis **Pie-grièche méridionale**

Les populations du sud marocain se sont bien rétablies après quelques années difficiles probablement liées à la sécheresse. Bonne saison de reproduction, plusieurs couples ayant produit deux pontes.

Corvus ruficollis **Corbeau brun**

Commun jusque dans les années 1980 dans la région d'Alnif (M. Ihmadi comm. pers.)

Passer hispaniolensis **Moineau espagnol**

Plusieurs colonies actives installées dans les jujubiers au milieu de maïders cultivés en céréales dans la plaine de Bouarfa début Mai.

Quelques couples ont établi leurs nids dans les acacias de la vallée du Zguid, 20 km au nord de Foum Zguid le 12 Mai, et profitent des cultures de céréales en cours de moisson.

Fringilla coelebs **Pinson des arbres**

Présent dans la palmeraie de Souk Tleta de Tagmoute sur le flanc sud de l'Anti-Atlas le 14 Mai.

Serinus serinus **Serin cini**

Parades dans la palmeraie de Figuig 9 Mai. Jeunes hors du nid dans la palmeraie d'Alnif le 10 Mai. Chants dans la palmeraie de Souk Tleta de Tagmoute, Anti-Atlas, le 14 Mai.

Carduelis chloris **Verdier d'Europe**

Un chanteur dans les jardins de l'hôtel 'Climat du Maroc' à Bouarfa le 5 Mai. Présent dans la palmeraie de Figuig le 9 Mai et dans la palmeraie de Souk Tleta de Tagmoute, Anti-Atlas, le 14 Mai.

Carduelis carduelis **Chardonneret élégant**

Présent dans le palmeraie de Figuig le 9 Mai.

Carduelis cannabina **Linotte mélodieuse**

Quelques-unes dans les jardins de l'hôtel 'Climat du Maroc' à Bouarfa le 5 Mai, et plusieurs à Aïn Tanzara dans le Jbel Grouz le 8 Mai.

Emberiza calandra **Bruant proyer**

Un chanteur dans un champ de céréales en bordure de l'Oued Zguid, à 29 km au sud de Tazenakht le 12 Mai.

Bibliographie

Bergier, P. 2004 - Quelques observations d'automne dans le Sahara Atlantique et la région du Bani. *Go-South Bull.* 1, 1-6.



Annexe 1 – Données de reproduction

Région : **AACEN** = Anti-Atlas Central, **ATSAH** = Atlas saharien, **HAHA** = Haha, **MYDRA** = Moyen Dra, **SARHR** = Sarhro, **SESAH** = Sud-Est Saharien, **SOUSS** = Souss, **TAFIL** = Tafilalt

DDP : Date estimée de début de ponte, en mois-décade (ex: 03-D2 = deuxième décade de Mars, 05-D1 = première décade de Mai), **P** = Taille de la ponte, **NN** = Taille de la nichée à la naissance, **N** = Taille de la nichée, tous âges confondus, **NE** = Taille de la nichée à l'envol

p/x = Nichée de x poussins ; **c/x** = ponte de x oeufs

Espèce	Lieu	Région	DDP	P	NN	N	NE	Détails
<i>Tadorna ferruginea</i>	Bouarfa - Figuig (embranchement Iche)	ATSAH	03-D2			5		p/5 de 2-3 semaines le 09.05
<i>Tadorna ferruginea</i>	Merzouga	TAFIL	04-D1			7		p/7 de quelques jours le 10.05
<i>Falco tinnunculus</i>	Imitek	AACEN	03-D1			4	4	p/4 prêts à l'envol, nid dans falaise, le 15.05
<i>Cursorius cursor</i>	Mengoub	SESAH	04-D1			2		p/2 de 10 jours le 05.05
<i>Cursorius cursor</i>	Mengoub	SESAH	04-D2			2		p/2 de 3-4 jours le 05.05
<i>Cursorius cursor</i>	Mengoub	SESAH	04-D1			2		p/2 de 15 jours le 05.05
<i>Charadrius dubius</i>	Oued El Maleh, Tissint	MYDRA	04-D1					p/1 de 10 jours le 13.05
<i>Streptopelia decaocto</i>	Oued Quabrinouche, 25 km à l'ouest d'Alnif	SARHR	05-D1	2				c/2, h = 3 mètres dans acacia, le 11.05. Fond d'oued en plein reg
<i>Streptopelia turtur</i>	Bouarfa (Jnane Betoum)	ATSAH	05-D1					c/1 incomplète, h = 4 m sur béton, le 07.05
<i>Alaemon alaudipes</i>	Mengoub (Oued el Jdid)	SESAH	05-D1	4				c/4 incubés 3 jours, nid sur Hamada scoparia, h = 20 cm, le 06.05
<i>Rhamphocorys clotbey</i>	Mengoub (Oued el Jdid)	SESAH	05-D1					c/3 frais au pied de <i>Hamada scoparia</i> le 06.05
<i>Galerida (c) randoni</i>	Mengoub (Oued el Jdid)	SESAH	04-D3	6				c/6 incubés 3 jours le 06.05
<i>Galerida theklae</i>	+66 km d'Igherm, en direction de Taliouine	AACEN	05-D2	4				c/4 incubés 2 jours le 15.05
<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	Bouarfa - Figuig (Jbel Ari Aira)	ATSAH	03-D3				3	p/3 volant le 09.05
<i>Oenanthe deserti</i>	Mengoub (Oued el Jdid)	SESAH	04-D3	4				c/4, h = 3 mètres dans falaise de terre, le 06.05
<i>Oenanthe leucopyga</i>	Aït Haroun, Anti-Atlas	AACEN	04-D1					p/1 mal volant dans une citerne / rethara le 15.05
<i>Sylvia conspicillata</i>	Jbel Guir (Ain Tanzara)	ATSAH	04-D1				4	p/4 de 12 jours, h = 50 cm dans romarin, le 08.05
<i>Sylvia nana</i>	Mengoub (Oued el Jdid)	SESAH	04-D1					p/1 subvolant dans fond d'oued arénacé avec touffes d'alfa, <i>Ferula cotoniana</i> et <i>Zyla macroptera</i> le 06.05
<i>Lanius meridionalis</i>	Oued Quabrinouche, 25 km à l'ouest d'Alnif	SARHR	03-D3					p/4 volant le 11.05
<i>Lanius meridionalis</i>	Tata	AACEN	05-D1	5				c/5 incubés 1/2, h = 1,8 m dans acacia, le 14.05
<i>Lanius meridionalis</i>	Tafinegoult	SOUSS	05-D3					Nid en début de construction, h=4 m dans arganier, le 16.05. 2° ponte
<i>Lanius meridionalis</i>	Taghazout	HAHA	04-D2					p/2 quittant le nid, h = 3 m dans arganier, le 16.05
<i>Lanius senator</i>	Taliouine	AACEN	04-D2					1 jeune à peine sorti du nid le 15.05
<i>Carduelis carduelis</i>	Al Malte, près Taliouine	AACEN	04-D2					2 gros jeunes volants nourris par les adultes le 15.05
<i>Emberiza striolata</i>	Tazzarine	SARHR	05-D2					Nid presque fini le 11.05
<i>Emberiza striolata</i>	Grottes de Messalite, Tata	AACEN	05-D2					c/4 incomplète, h=1,5 m dans mur de maison abandonnée, le 14.05
<i>Emberiza striolata</i>	Grottes de Messalite, Tata	AACEN	04-D1					Une famille avec jeunes à peine volants le 14.05