



Les oiseaux rares au Maroc

Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine

Numéro 17 (2011)

Patrick BERGIER ⁽¹⁾, Jacques FRANCHIMONT ⁽²⁾, Michel THEVENOT ⁽³⁾
et la Commission d'Homologation Marocaine

⁽¹⁾ Go-South - 4 Avenue Folco de Baroncelli – 13210 Saint Rémy de Provence (France)
www.go-south.org pbergier@yahoo.fr

⁽²⁾ Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22 – 50.000 Meknès V.N. (Maroc)
j.franchimont@menara.ma

⁽³⁾ 353 chemin des Mendrous – 34170 Castelnau-le-Lez (France)
michelthevenot@wanadoo.fr

Disponible en ligne (Available online) : 7 janvier 2012

Summary

Rare birds in Morocco: 17th (2011) report of the Moroccan Rare Birds Committee. In 2011, MRBC examined 132 records of which 114 were accepted. These included the second Moroccan records of Fulmar *Fulmarus glacialis* and Rose-coloured Starling *Sturnus roseus*, and the third of Lesser Scaup *Aythya affinis*, Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* and confirmed Moroccan Plain Swift *Apus unicolor*. Also noteworthy are the 3rd to 5th of Rueppell's Vulture *Gyps rueppellii* and Buff-breasted Sandpiper *Tryngites subruficollis*, the 4th of American Golden Plover *Pluvialis dominica* and

Namaqua Dove *Oena capensis*, the 4th and 5th of Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis*, the 5th of Green-winged Teal *Anas carolinensis* and Balearic Shrike *Lanius senator badius*, the 5th and 6th of Franklin's Gull *Larus pipixcan*, the 7th of Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* and Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*, the 7th and 8th of White-faced Storm-petrel *Pelagodroma marina* and the 8th of Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii*, Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* and Collared Flycatcher *Ficedula albicollis*.

Introduction

Pour cette session, la Commission était composée de onze membres dont dix ont activement participé aux votes :

Patrick Bergier, Imad Cherkaoui, Ahmed El Ghazi, Mostafa Fareh, Diego Jerez Abad, Benoît Maire, Abdeljebbar Qninba, Ahmed Sayad, Michel Thévenot et Arnoud B. van den Berg. Le secrétariat a été assuré par Jacques Franchimont.

En 2011, la Commission a reçu un nouveau nombre record de dossiers. Après avoir traité une moyenne de 40 demandes d'homologation par an de 1995 à 2005, ce nombre s'est élevé à 65 en 2006, 70 en 2007, 88 en 2008, 97 en 2009, 110 en 2010 et 132 cette année. Elles se répartissent

comme suit : deux observations réalisées en 2005, une en 2006, une en 2007, deux en 2008, deux en 2009, 65 en 2010 et 59 en 2011.

Nous remercions tous les observateurs qui ont communiqué leurs observations à l'un des membres ou au Secrétaire de la Commission :

Prof. Jacques Franchimont
Quartier Abbas Lemsadi, rue n°6, n°22
50.000 Meknès V.N. (Maroc)

Le Secrétariat de la Commission étant informatisé, il est recommandé de transmettre ses demandes d'homologation par courriel à j.franchimont@menara.ma. La liste des espèces à

soumettre à homologation a été revue ; elle est disponible sur www.go-south.org. Un modèle de fiche est téléchargeable à partir du même site (www.go-south.org/05_MRBC/mrbc_form.doc) ou sur le site du GOMAC à http://perso.menara.ma/gomac/MRBC_Form.doc.

Cent quatorze données ont été acceptées (taux d'acceptation de 86%). Dix-huit autres n'ont pu être homologuées, le plus souvent par manque de description précise de l'oiseau observé ; la CHM

Présentation des données

La présentation des données homologuées suit celle adoptée depuis le premier rapport de la CHM (Bergier *et al.* 1996). La séquence est la suivante :

- Nom de l'espèce, français, anglais et scientifique.
- Statut abrégé, selon les codes définis dans la Checklist 'The birds of Morocco' (Thévenot *et al.* 2003) et utilisés depuis le sixième rapport de la CHM (Bergier *et al.* 2000c) :
- **RB** (*Resident breeder*) - Sédentaire
- **BM** (*Breeding migrant*) - Estivant nicheur
- **OB** (*Occasional breeder*) - Nicheur occasionnel
- **FB** (*Former breeder*) - Nicheur disparu
- **PM** (*Passage migrant*) - Migrateur au long cours
- **WV** (*Winter visitor*) - Hivernant
- **OW** (*Occasional winter occurrence of regular migrant species - BM, PM*) - Présence hivernale occasionnelle d'une espèce habituellement estivante nicheuse ou migratrice au long cours
- **AV** (*Accidental visitor, either vagrant from outside Palaearctic (e.g. Nearctic or Afro-tropical species) or Palaearctic species with less than 30 records in Morocco*) - Visiteur accidentel, égaré non-Paléarctique (e.g. espèces Néarctiques ou Afro-tropicales) ou en provenance du Paléarctique avec moins de 30 données au Maroc)
- **F(AV)** (*Former accidental visitor, not recorded since 1899*) - Visiteur accidentel, plus noté depuis 1899
- **?** (*Indicates a doubt over the status immediately preceding the question mark, but not of occurrence*) - Indique un doute sur le statut concerné.

Décisions de la CHM

La Commission n'analysera plus les observations de Moinelette à front blanc *Eremopterix nigriceps*, d'Alouette de Dunn *Eremalauda dunni* et de Prinia à front écaillé *Spiloptila clamans* effectuées à partir du 27

demande instamment aux auteurs de détailler soigneusement leurs observations (et dans la mesure du possible de les illustrer), de manière à ce que la Commission puisse plus fréquemment statuer positivement sur les demandes qui lui sont adressées. Il est aussi demandé aux observateurs de ne pas envoyer de fiches sans description, même quand elles sont appuyées par de bonnes photographies.

Pour les espèces accidentelles, ce code statut est suivi de six chiffres entre parenthèses :

- les deux premiers rappellent respectivement le nombre de données enregistrées par la Centrale Ornithologique Marocaine (COM) jusqu'à la mise en place de la CHM et le nombre d'individus correspondant (hors données anciennes enregistrées par la COM puis soumises à la CHM),
- les deux suivants indiquent le nombre de données homologuées depuis 1995, date de création de la CHM (données du présent rapport exclues) et publiées dans les seize premiers rapports de la CHM (Bergier *et al.* 1996 - 2011), et le nombre d'individus correspondant,
- les deux derniers représentent le nombre de données acceptées dans ce présent rapport et le nombre d'individus correspondant.

Pour les espèces rares ou mal connues, seuls les quatre derniers nombres figurent entre parenthèses après l'indication de leur statut.

- Présentation des données par ordre chronologique : année, numéro de demande d'homologation (attribué par la CHM), région (cf. carte), localité, effectif (si non précisé, se réfère à un individu), âge et sexe si connus, date(s) d'observation, autres précisions si nécessaire, observateur(s).

- Commentaires.

La séquence systématique et les noms utilisés sont cohérents de ceux de la 'Liste des espèces à soumettre à homologation au Maroc' disponible sur www.go-south.org.


décembre 2010 dans le sud saharien atlantique sur la route Dakhla – Awserd.

Ces trois espèces y sont à présent régulièrement observés et assez abondantes. Les observations de ces

trois espèces effectuées en dehors de cette zone restent toutefois soumises à homologation.

Par ailleurs, les observations de Faucons de Barbarie *Falco pelegrinoides* ne sont plus à soumettre à homologation à partir du 3 novembre 2011. En effet, cette espèce s'est avérée être relativement commune dans la majeure partie du pays et son statut assez bien établi malgré l'existence d'individus au plumage intermédiaire (hybrides ?) avec le Faucon pèlerin. Par contre, l'énigmatique forme 'atlantique' du Faucon 'pèlerin du Sous' *Falco peregrinus/pelegrinoides* 'atlantis' a été annexée à la liste des taxons homologables, depuis le 27 décembre 2010.

Figure 1. Régions et sous-régions du Maroc (d'après Thévenot *et al.* 2003)



Liste systématique des données acceptées

Bernache cravant – Brent Goose *Branta bernicla* AV (4/14, 5/17, 2/8)

2011 (11/04) Tarfaya, Khnifiss, 4 oiseaux, photo, 26 janvier (I. Cherkaoui)

2011 (11/06) Oued Ad-Deheb, Dakhla pointe de la Sarga, 3 oiseaux de la sous-espèce nominale *bernicla*, photo, 11 janvier (A. Qninba *et al.*) et 4 adultes de la sous-espèce nominale *bernicla*, 15 février (T.A. Olsen *et al.*)

C'est la quatrième fois que l'hivernage est rapporté à Khnifiss (Radi *et al.* 2009, Bergier *et al.* 2010) et la seconde fois à Dakhla (*Birding World* 2006, 19 :103). Il n'existe que deux mentions plus au sud en Mauritanie et au Sénégal (Isenmann *et al.* 2010).

Sarcelle à ailes bleues – Blue-winged Teal *Anas discors* AV (14/22+, 7/7, 2/2)

2011 (11/03) Rharb, Sidi bou Rhaba, mâle adulte, photo, 22 janvier (A. Mathurin *et al.*)

2011 (11/24) Doukkala, Oualidia, femelle adulte, 3 avril (A. Mathurin)

Premières données transmises à la CHM depuis 2006 (Bergier *et al.* 2007).

Sarcelle à ailes vertes – Green-winged Teal *Anas carolinensis* AV (2/2, 2/2, 1/1)

2011 (11/28) Souss, embouchure Oued Souss, mâle adulte, photo, 28 mars (A. Ofner *et al.*)

Cinquième mention marocaine. Le tableau ci-dessous récapitule les quatre précédentes observations de Sarcelle à ailes vertes au Maroc

Date	Lieu (région)	Sexe	Référence
13 avril 1959	Barrage d'Imfout (Rehamna)	Mâle	Frété (1959)
23 - 27 avril 1984	Oued Massa (Souss)	Mâle	T. Axelsen, G. Balança, A.W. Clarke <i>et al.</i> (in Thévenot <i>et al.</i> 2003)
28 février 1998	Oued Massa (Souss)	Mâle	C. Bowden & G. Manners (dossier CHM #98/01 – Bergier <i>et al.</i> 2000a)
5 février 2005	Oualidia (Doukkala)	Mâle	S. Werner <i>et al.</i> (dossier CHM #05/08 – Bergier <i>et al.</i> 2006)

Fuligule à tête noire – Lesser Scaup *Aythya affinis* AV (0/0, 2/2, 1/1)

2011 (11/39) Oued Ad-Deheb, Mijk, mâle adulte, photos, mi-avril – mi-mai (F. Chevalier)

Troisième mention marocaine de cette espèce néarctique. Le tableau ci-dessous récapitule les deux précédentes observations de Fuligules à tête noire au Maroc.

Date	Lieu (région)	Sexe	Référence
5 avril 2004	Affenourir (Western Middle Atlas)	Femelle	V. Schollaert <i>et al.</i> (dossier CHM #04/17 – Bergier <i>et al.</i> 2005)
11 février 2010	Oued Massa (Souss)	Mâle	M. Beevers <i>et al.</i> (dossier CHM #10/18 – Bergier <i>et al.</i> 2011)

Fuligule à bec cerclé – Ring-necked Duck *Aythya collaris* AV (9/13, 11/14, 2/2)

2011 (11/10) Souss, Oued Massa, femelle, 23 février (B. de Lange), revue le 26 février, photo (Bockhill Birders, www.flickr.com/photos/brendan2010/5489519215/), puis le 13 mars, photo (R. Riddington *et al.*)

2011 (11/40) Rharb, Kénitra, mâle adulte semblant apparié à une femelle de Fuligule nyroca *Aythya nyroca*, photo, 16 mai (A. Elbanak & R. El Khamlichi)

Douzième et treizième données de cette espèce néarctique transmises à la CHM.

Erismature à tête blanche – White-headed Duck *Oxyura leucocephala* WV, RB, PM ? (21/57, 2/9)

2010 (10/60) Rharb, Sidi bou Rhaba, six mâles et une femelle, 17 avril (E. Albegger *et al.*)

2011 (11/17) Chiadma, Essaouira, deux oiseaux probablement immatures, 8-12 mars (P.J. Dubois)

Cette espèce étant maintenant, comme à Douyiet, devenue résidente et nidificatrice à Sidi bou Rhaba, la donnée 10/60 est la dernière concernant ce site à être examinée par la Commission (décision CHM en date du 2 octobre 2010 – Bergier *et al.* 2011).

Les deux oiseaux d'Essaouira fréquentaient les plans d'eau de la station d'épuration au nord de la ville (cinq oiseaux avaient été notés au même endroit en janvier 2011 - Greig-Smith 2011).

A Douyiet au cours de l'hivernage 2010-2011, un minimum de 70 individus a été noté le 21 décembre 2010, et encore 40 individus le 3 février 2011. Au printemps suivant, une cinquantaine d'adultes, dont plusieurs mâles

paradant, étaient présents le 15 avril, laissant présager une nouvelle nidification. Enfin, le 4 octobre 2011, plus de 300 individus y ont été dénombrés, ce qui représente, et de loin, le record numérique absolu connu pour le pays (J. Franchimont et F. Touati Malih).

Erismature rousse – Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis* AV, OB ? (69/78, 7/31, 1/1)

2011 (11/02) Moyen Atlas occidental, Dayet Aoua, mâle nuptial, 21 janvier (J. Franchimont)

C'est la première donnée soumise et homologuée depuis 2001 (Bergier *et al.* 2002b) alors que d'après Cranswick & Hall (2010) l'espèce a été régulièrement observée au Maroc entre 1986 (date de première observation) et 2007 (date de dernière observation). Ces auteurs font état de 25 mentions totalisant 86 oiseaux (dont un groupe de 15) entre 1996 et 2007. De 1996 à 2009, le Maroc est aussi le seul pays avec l'Espagne où des hybrides Erismature à tête blanche x Erismature rousse ont été notés (annuellement de 1996 à 2002 puis un en 2009). Dans le cadre du programme d'éradication de l'espèce à l'échelle de l'Ouest Paléarctique, un plan d'action pluriannuel (2003–05) pour contrôler l'espèce au Maroc a été adopté lors d'un atelier de travail à Rabat en octobre 2003 (Cranswick & Hall 2010).

Harle huppé – Red-breasted Merganser *Mergus serrator* WV (7/12, 1/1)

2011 (11/20) Tarfaya, Khnifiss, femelle ou mâle de 2^e année, photo, 18 février (K.S. Olsen *et al.*)

Donnée la plus au sud jamais enregistrée le long de la côte Atlantique pour ce rare hivernant européen. Les précédentes données les plus méridionales provenaient des Oueds Souss (2 mentions) et Massa (2 mentions) (Thévenot *et al.* 2003, Bergier *et al.* 2008).

Fulmar boréal – Fulmar *Fulmarus glacialis* AV (1/1, 0/0, 1/1)

2011 (11/37) Souss, Aglou, adulte, 21 avril (J.S. Rousseau-Piot)

On ne connaissait qu'une seule mention antérieure au Maroc, bien plus au nord (un oiseau échoué à Moulay Bousselham le 12 janvier 1985 – Thévenot *et al.* 2003).

Pétrel de Bulwer – Bulwer's Petrel *Bulweria bulwerii* AV (7/33+, 0/0, 1/1)

2011 (11/47) Haha, Cap Rhir, 16 juin (H. Dufourny *et al.*)

Huitième donnée marocaine, la première soumise à homologation depuis la création de la CHM. C'est aussi la première donnée citée en juin pour le pays. Sans doute originaire de ses zones de nidification situées aux Iles Canaries, aux Iles Salvages ou à Madère.

Puffin des Anglais – Manx Shearwater *Puffinus puffinus* PM, OW (4/380+, 2/25)

2010 (10/73) Rharb, Salé, 22 oiseaux, photos, 7 octobre (I. Cherkaoui & A. Bouajaja)

2011 (11/41) Haha, Cap Rhir, trois oiseaux en migration nord en 2,5 heures, 10 juin (D. López Velasco *et al.*)

Cinquième et sixième mentions homologuées depuis la création de la CHM. Celle de juin 2011 est la plus tardive enregistrée à ce jour (cf Thévenot *et al.* 2003).

Les mouvements prénuptiaux le long des côtes marocaines concernent probablement des oiseaux de l'Atlantique Nord (Iles britanniques, France, Féroé, Islande) mais pourraient aussi impliquer des mouvements locaux de la petite population des Canaries, voire de celle de Madère.

Océanite frégate – White-faced Storm-petrel *Pelagodroma marina* AV (4/33+, 2/4+, 2/5)

2011 (11/36) Souss, 22 miles au large d'Agadir, quatre oiseaux, photos, 30 avril (A. Mathurin *et al.*)

2011 (11/48) Haha, Cap Rhir, oiseau en vol nord, 16 juin (H. Dufourny *et al.*)

Septième et huitième mentions marocaines. Elles ont eu lieu en février (1), mars (1), avril

(1), mai (3) et juin (2) (Thévenot *et al.* 2003, Bergier *et al.* 2008). Comme celle du 30 avril, les deux autres mentions analysées précédemment par la CHM proviennent du large d'Agadir. Celle du 16 juin au Cap Rhir est la plus au nord, les précédentes s'étalant de la frontière mauritanienne à Agadir.

Océanite culblanc – Leach's Storm-petrel *Oceanodroma leucorhoa* PM, WV (2/2, 2/1400+)

2010 (10/96) Rharb, Mehdia, 28 novembre (B. Maire & GOMAC)

2010 (10/103) Rharb, Mehdia, 1400 oiseaux, photos, 23 décembre (S. Claden)

Une séance de seawatching à partir de la jetée sud de Mehdia le 23 décembre a été extrêmement productive : le fort coup de vent de sud-ouest (7/8 Bfr) des 20-22 décembre a ramené une poche de petits oiseaux pélagiques sur la côte et vers le nord (24 Phalaropes à bec large, 650 Océanites tempêtes et 1400 Océanites culblancs). Il n'y eut que très peu de fous et de labbes, et aucun Laridé pélagique ni de puffin. Certains des oiseaux observés restaient même quelques minutes dans l'Oued Sebou pour se nourrir (observés jusqu'à un km en amont de l'embouchure). Un épisode semblable est rapporté par H. Dufourny (*in* Thévenot *et al.* 2003) quand plus de 1450 oiseaux furent comptés en mer en 2h50' de sea-watching depuis la côte à Larache et quelques-uns vus le même jour volant au dessus du Bas-Loukkos jusqu'à 17 km à l'intérieur des terres lors d'une période de tempête.

Seulement les troisième et quatrième mentions homologuées par la CHM, pour une espèce manifestement sous-observée et qui doit pourtant passer, voire hiverner, en bon nombre au large de nos côtes.



Bécasseau rousset (dossier 10/55) Khemis Zemamra, 23 septembre 2010 (I. Robbe)




Océanite culblanc (dossier 10/103). Mehdia, 23 décembre 2010 (S. Claden)

Butor étoilé – Bittern *Botaurus stellaris* PM, WV, RB/BM ? (13/13, 2/2)

2010 (10/75) Plaines du Maroc Oriental, Barrage Mechra Homadi, adulte, 12 novembre (D. Jerez Abad & R. Ramírez Espinar)

2010 (10/78) Maroc, suivi satellite



Une femelle adulte (Elly) a été munie d'un émetteur satellite le 17 juin 2010 à Ilperveld, Noord-Holland, Pays-Bas. Elle a été localisée dans le Sahara Atlantique le 26 octobre, puis près de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal le 28 octobre, et enfin en Gambie le 5 novembre, 4836 km au sud de son site de nidification (info A.B. van den Berg, WP reports in *Dutch Birding* 32-6 et www.roerdomp.info consulté le 6 février 2011).

Après être descendue jusqu'en Gambie, Elly est remontée jusqu'en France au printemps 2011 (www.vogelbescherming.nl/vogels_beschermen/zenderonderzoeken/roerdomp consulté le 10 juillet 2011).

Aigrette des récifs – Western Reef Heron *Egretta gularis* AV (18/19, 7/4, 3/2)

2010 (10/69) Chiadma, Essaouira, adulte de phase sombre, photos, nombreux observateurs (10 avril E. Albegger *et al.*, 10 juillet H. Dufourny, 31 juillet M. Barry & A. Mathurin,...)

2011 (11/01) Chiadma, Essaouira, adulte de phase sombre, photos, suite du dossier 10/69, nombreux observateurs (12 janvier P. Ferrer Poblete, 13 février S. Brayshaw, 7-12 mars P.J. Dubois, 19 juin P. de Harenne)

2011 (11/43) Doukkala, Oualidia, Oulad Ghanem, oiseau de morphe sombre, photos, 21 juin (H. Dufourny *et al.*)

Avant les résultats de cette session, la CHM avait analysé sept dossiers correspondant à quatre oiseaux différents, si l'on accepte le fait que les observations réalisées à Essaouira depuis 2007 concernent le même individu (dossiers 07/73, 09/21, 09/62, 09/68). Lors de cette session, les dossiers 10/69 et 11/01 concernent sans doute encore ce même oiseau, et seul l'individu du dossier 11/43 pourra s'ajouter au total général des individus homologués par la CHM depuis sa création, portant celui-ci à cinq (dont quatre de phase sombre) avec la répartition géographique suivante (du nord au sud) : un à Oualidia, un à Essaouira, un à Massa et deux à l'embouchure du Souss.

On notera que l'adulte sombre d'Essaouira a été observé en juin 2010 posé au sein d'une petite colonie de 8 à 10 nids d'Aigrettes garzettes dans la grande île de l'archipel, laissant envisager la possibilité d'une hybridation entre les deux espèces. Cette

hypothèse n'a toutefois pu être formellement prouvée (par l'observation de jeunes) lors de visites ultérieures en août et septembre (Qninba *et al.* 2011).

Grande Aigrette – Great White Egret *Casmerodius albus* WV, PM (69/128+, 3/3)

2010 (10/52) Doukkala, Moul Bergui, Oualidia, photo, 14 juillet (H. Dufourny)

2010 (10/71) Doukkala, Oualidia, photo, 3 octobre (M. Fareh & B. Maire)

2010 (10/98) Souss, Embouchure du Souss, 25 décembre (B. Maire *et al.*)

A la suite de l'énorme expansion que la Grande Aigrette connaît de nos jours en Europe Occidentale (France, Belgique, Pays-Bas, etc...), l'espèce continue son expansion hivernale vers le sud du pays ; les données obtenues cette année rentrent dans le cadre de ce phénomène.

Rappelons que, depuis 2009, l'espèce n'est plus soumise à homologation au nord d'une ligne allant d'El Jadida à Oujda, où elle est devenue migratrice et hivernante de plus en plus régulière durant cette dernière décennie.

Flamant nain – Lesser Flamingo *Phoenicopterus minor* AV (11/11, 0/0, 1/1)

2010 (10/107) Doukkala, Oualidia, photo, 30 avril (R. Beunen)

Douzième mention marocaine, la première transmise à la CHM. L'oiseau a été revu et photographié le 5 mai (C. Lansdell,

<http://canarybirders.webs.com/westernsaharamay2010.htm>

En sus des 11 mentions citées par Thévenot *et al.* (2003), on connaît la reprise d'un oiseau bagué poussin en 1962 au Lac Magadi, Kenya, retrouvé mort à Layoune en septembre 1997 (seule preuve par baguage d'un échange d'individus entre les populations est- et ouest-africaines – Childress 2004, Childress & Hughes 2007).

Gypaète barbu – Lammergeier *Gypaetus barbatus* RB (12/15, 2/2)

2005 (05/56) Haut Atlas occidental, Jbel Toubkal, adulte, photo, 19 avril (J. Veal)

2011 (11/33) Haut Atlas occidental, Oukaimeden, adulte, 28 janvier (W. Meinken)

La situation dans le Parc National du Toubkal a été synthétisée par Cuzin (2010) : 'Au cours de l'été 2009, l'effectif dans l'ensemble du Parc National est d'au moins 4 à 6 oiseaux (dont un jeune de l'année), avec une unité reproductrice, potentiellement deux, et une reproduction qui n'a eu de succès qu'en 2009, et ce depuis au moins 2002 ; ces données concordent avec l'effectif minimal observé d'au moins 2 adultes et 3 immatures en octobre 2002 par Godino *et al.* (2005). Les domaines vitaux sont extrêmement vastes, puisqu'il semble selon de nombreuses données que les adultes soient capables d'aller depuis le secteur du Toubkal jusqu'à l'Oukaimeden, où l'espèce est régulièrement observée'

Vautour de Rüppell – Rueppell's Vulture *Gyps rueppellii* AV/PM (0/0, 2/2, 3/5)

2010 (10/74) Tangérois, entre Fnideq et Sebta, adulte cerclant en compagnie d'une vingtaine de Vautours fauves *Gyps fulvus*, 23 octobre (I. Cherkaoui)

Faucon de Barbarie – Barbary Falcon *Falco peregrinoides* RB mal connu (92/104+, 11/13)

2005 (05/57) Haha, Tamri, photo, 25 décembre (Frode Falkenberg, www.flickr.com/photos/cyberbirding/5600323508/in/photostream consulté le 7 mai 2011)

2008 (08/72) Tafilalt, Merzouga, immature, photos, 22 novembre (J. Heip)

2010 (10/64) Tarfaya, 50 km au sud de Tantan, couple adulte, photos, 6 avril (E. Albegger *et al.*)

2010 (10/72) Souss, Massa, immature, photo, 15 août (T. Peral)

2010 (10/91) Dadès-Draa, Agdz, immature, photos, 10 décembre (B. Rodríguez & N. Carrasco)

2010 (10/93) Souss, embouchure du Souss, femelle immature, photos, 25 octobre (B. Maire & GOMAC)

2010 (10/94) Souss, embouchure du Souss, mâle d'un an et demi, photos, 26 octobre (B. Maire)

2010 (10/106) Haha, Tamri, photo, 13 avril (M. Gottenbos)

2010 (10/109) Souss, Massa, adulte, 26 octobre (D.F. Walsh *et al.*)

2011 (11/09) Haha, Tamri, couple, photos, 20 février (I. Cherkaoui & A. Bouajaja)

2011 (11/50) Plaines du Maroc Oriental, Melilla, juvénile, photos, 7 et 9 juin (D. Jerez Abad)

2010 (10/80) Tangérois, Ksar Sghir, oiseau de première année accompagnant une dizaine de Vautours fauves, photo, 1 août (J. Ramírez Román & R. El Khamlichi)

2011 (11/38) Tangérois, Jbel Moussa, deux immatures et un subadulte en migration nord (respectivement à 10h20', 12h05' et 16h22', accompagnant de grands groupes de Vautours fauves), photos, 7 mai (D. Jerez Abad & R. Ramírez Espinar)

Troisième, quatrième et cinquième mentions marocaines.

En Espagne, les mouvements printaniers d'individus terminant leur traversée du Déroit de Gibraltar, souvent en compagnie de Vautours fauves, sont notés de plus en plus fréquemment, ce qui devrait faire croître encore le nombre d'observations marocaines dans un futur très proche (Onrubia *et al.* 2009 ; Ramírez *et al.* 2011).

Aigle pomarin – Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* AV (0/0, 2/2, 1/1)

2010 (10/53) Tangérois, Tanger, Jbel Moussa, subadulte, 26 septembre (D. Jerez Abad *et al.*)

Troisième mention marocaine, la deuxième sur la rive sud du Déroit de Gibraltar. L'oiseau était en migration active vers le sud, volant conjointement avec de nombreux Aigles bottés et Circaètes Jean-le-Blanc.

Il n'y avait que quatre mentions (4 oiseaux) acceptées en Espagne à fin 2008, dont deux dans le sud de la Péninsule (Doñana et Tarifa) (Dies *et al.* 2010). Depuis, c'est là sur la rive nord du Déroit de Gibraltar qu'un suivi soutenu a permis de noter 12 oiseaux au passage en 2008, dont 5 au printemps et 7 à l'automne (Ramírez 2009, Onrubia *et al.* 2009).

Ci-contre : les oiseaux observés au sud de Tantan le 6 avril 2010 ont la poitrine très rayée (E. Albegger)

Ci-dessous : mâle d'un an et demi à l'embouchure du Souss le 26 octobre 2010 (B. Maire)



Les observations de Faucons de Barbarie ne sont plus à soumettre à homologation à compter du 3 novembre 2011. Vu le nombre élevé d'oiseaux homologués par la CHM depuis sa création, l'espèce n'est manifestement pas rare et s'avère bien répandue sur l'ensemble du territoire national marocain.

Faucon de Barbarie & Faucon pèlerin 'atlantis' – Barbary & 'atlantis' Falcons – *Falco peregrinoides* & *peregrinus* 'atlantis' (1/1, 1/1)
2010 (10/97) Haha, Taghazoute, adulte, photos, 25 décembre (S. Claden *et al.*)

Ce taxon particulier, dont on ne connaît pas le statut exact (cf Bergier *et al.* 2011) et qui semble assez rare et localisé aux secteurs côtiers du Souss et des Haha, vient d'être récemment annexé à la liste des taxons homologables au Maroc. Après la femelle du couple 'mixte' avec mâle Faucon de Barbarie (cf dossier 10/09 - Bergier *et al.* 2011), cette donnée constitue la seconde analysée et acceptée par la CHM.

Turnix mugissant – Small Buttonquail *Turnix sylvaticus* RB (5/11, 4/12+)
2009 (09/94) Doukkala, Sidi Abed, au moins huit oiseaux dont 2-3 femelles encore chanteuses,

enregistrement, 29 septembre - 1 octobre (A.B. van den Berg)

2010 (10/84) Doukkala, région de Oualidia, femelle chanteuse, 24 juillet (M. Barry & A. Mathurin)

2010 (10/85) Doukkala, région de Oualidia, femelle chanteuse, 15 août (A. Mathurin)

2010 (10/112) Doukkala, Safi, Aysir, deux femelles chanteuses, enregistrement de l'une d'entre elles, 26 et 27 juin (A.B. van den Berg)

L'historique de l'espèce et sa répartition actuelle au Maroc ont été décrits récemment par Gutiérrez Expósito *et al.* (2011).

Talève d'Allen – Allen's Gallinule *Porphyrio alleni* AV (5/5, 1/1, 1/1)

2011 (11/51) Tangérois, Estuaire du Tahadart, photo, 16 janvier (M. Amezian)

L'oiseau a été trouvé mort. C'est la septième donnée nationale pour cette espèce d'origine

afro-tropicale, et la seconde homologuée par la CHM depuis sa création. Comme cinq autres des sept mentions marocaines connues, elle a été enregistrée sur la côte atlantique, mais c'est la plus septentrionale de celles-ci.

Marouette de Baillon – Baillon's Crane *Porzana pusilla* PM, BM, OW (3/5+, 2/2)

2011 (11/22) Oued Ad-Deheb, Gleb Jdiane, adulte, photos, 3 mars (B. Maire & A. Mathurin)

2011 (11/30) Dadès-Draa, Barrage Mansour Eddahbi, photos, 1 avril (A. Ofner *et al.*)

Quatrième et cinquième données validées par la CHM depuis sa création. Celle de Gleb Jdiane a eu lieu en plein désert dans une petite caricaie établie au niveau d'une mare liée à

une fuite sur un pompage, le long de la route d'Awserd.

Marouette poussin – Little Crane *Porzana parva* PM (8/21+, 2/2)

2007 (07/80) Dadès-Draa, Barrage Mansour Eddahbi, photos, 11 mars (A. van Dijk)

2011 (11/31) Rharb, marais du Bas Loukkos, mâle adulte, photos, 16 avril (A. Watson & E. Woodwell)

Neuvième et dixième données validées par la CHM depuis sa création. Dates et lieux classiques pour ce migrateur discret jusqu'à présent seulement rencontré au Maroc en période de migration prénuptiale.


Outarde houbara – Houbara *Chlamydotis undulata* RB (4/5, 3/16+)

2008 (08/71) Tafilalt, Erg Chebbi, trois oiseaux, photo, avril (A. Simay)

2011 (11/15) Haute Moulouya, Midelt, au moins 12 oiseaux, photo, 27 février (J. Ramírez Román *et al.*)

2011 (11/29) Tafilalt, Erg Chebbi, photo, 4 avril (A. Ofner *et al.*)

Fin 2008, soit dix ans après le premier lâcher de deux mâles, plus de 17000 outardes issues de l'élevage de l'ECW à Missouri auront été lâchées au Maroc. La capacité de ces oiseaux à survivre et se reproduire dans la nature, combinées aux mesures de protection des populations, a permis de multiplier par 10 la densité d'outardes au sein de la zone d'intervention de l'ECWP, soit 0,5 outarde au km², une des densités connues les plus élevées de l'aire de distribution de l'espèce (http://www.ecwp.org/vf/population_reinforcement.php consulté le 2 avril 2011).



Nombre d'oiseaux d'élevage lâchés annuellement au Maroc de 1998 à 2008.

Pluvier bronzé – American Golden Plover *Pluvialis dominica* AV (0/0, 3/3, 1/1)

2011 (11/18) Chiadma, Essaouira, oiseau de 2^e année, photos, 7-12 mars (P.J. Dubois & E. Rousseau)

L'oiseau était toujours présent le 11 avril (Frode Falkenberg, photo sur www.flickr.com/photos/cyberbirding/5614859522/in/photostream/).

.com/photos/cyberbirding/5614859522/in/photostream).

Quatrième mention marocaine, la première depuis 2001 et la plus précoce de celles enregistrées. Les trois précédentes avaient eu lieu à l'embouchure de l'Oued Souss entre fin avril et début juin (Bergier *et al.* 1998-99, 2000b, 2002a). Les 20 données ouest

africaines (du Maroc au Togo, d'octobre à juin) ont été synthétisées par Schmaljohann & Thoma (2005).

Bécasseau rousset – Buff-breasted Sandpiper
Tryngites subruficollis AV (0/0, 2/2, 3/3)

2006 (06/78) Doukkala, Oualidia, photo, 29 septembre (J. Renoult)

2010 (10/55) Doukkala, Khemis Zemamra, photos, 23 septembre (I. Robbe)

2011 (11/34) Dadès-Draa, Barrage Mansour Eddahbi, photos, 9-10 avril (A.B. van den Berg *et al.*)

Troisième, quatrième et cinquième mentions marocaines de ce bécasseau qui niche dans l'Arctique nord-américain. Trois de ces cinq observations sont de fin septembre et deux d'avril. De manière surprenante, il s'agit de la deuxième observation au Barrage Mansour Eddahbi (en zone semi-désertique à *ca* 280 km de la côte atlantique), après celle obtenue par J. Piette & H. Dufourny le 24 avril 2006 (Bergier *et al.* 2007).

Il y a 41 mentions (45 oiseaux) en Espagne péninsulaire et 7 mentions (7 oiseaux) aux Canaries à fin 2008 (Dies *et al.* 2010).

Dans le nord de l'Afrique, on connaît une mention ancienne pour la Tunisie (Castan 1964, Isenmann *et al.* 2005) mais aucune pour l'Algérie (Isenmann & Moali 2000) ou la Mauritanie (Isenmann *et al.* 2010).

Bécasseau tacheté – Pectoral Sandpiper *Calidris melanotos* AV (5/5, 2/3, 1/1)

2010 (10/110) Doukkala, Khemis Zemamra, juvénile, 23 septembre (I. Robbe).

Huitième mention marocaine et troisième reçue à la CHM, pour ce bécasseau Holarctique qui niche dans l'est de la Sibérie et en Amérique du Nord et hiverne en Amérique du Sud. La précédente remontait à 1998 et concernait deux juvéniles notés à l'embouchure de l'Oued Souss le 25 septembre, puis un seul jusqu'au 10 octobre, par R. Dawson et A. Edmond (Bergier *et al.* 2000c).

Il y a 215 mentions (253 oiseaux) en Espagne péninsulaire et 34 mentions (35 oiseaux) aux Canaries à fin 2008 (Dies *et al.* 2010).

Pour le nord de l'Afrique, il existe une mention en Mauritanie (Lamarche 1988) non retenue par Isenmann *et al.* (2010) et aucune en Algérie (Isenmann & Moali 2000) ni en Tunisie (Isenmann *et al.* 2005).

Chevalier à pattes jaunes – Lesser Yellowlegs
Tringa flavipes AV (4/5, 2/2, 1/1)

2011 (11/23) Doukkala, Oualidia, photo, 19 février, observé jusqu'au 3 avril 2011 au moins (S. Claden & A. Mathurin)

Septième mention marocaine, la quatrième à Oualidia et la première depuis 2001 (Bergier *et al.* 2002a).

Il existe treize observations aux Canaries (Dies *et al.* 2010), une en Mauritanie et deux au Sénégal (Isenmann *et al.* 2010).

Mouette de Sabine – Sabine's Gull *Larus sabini* PM, OW (5/43+, 1/3)

2011 (11/42) Haha, Cap Rhir, groupe de trois oiseaux en migration nord, 10 juin (D. López Velasco *et al.*)

Le Cap Rhir s'avère être un excellent lieu de sea-watching au Maroc.

Les observations réalisées depuis ce point permettent de mettre en évidence la présence et le passage d'espèces très pélagiques, telle la Mouette de Sabine, difficiles à observer autrement depuis les côtes, hormis lors de périodes de tempêtes avec forts vents d'ouest.

Mouette de Franklin – Franklin's Gull *Larus pipixcan* AV (0/0, 4/4, 2/2)

2010 (10/82) Souss, embouchure du Souss, adulte en plumage d'hiver, 12 décembre (T. Charlton)

2011 (11/44) Haha, Aghroud, adulte en plumage d'été, photos, 16 juin (H. Dufourny *et al.*)

Cinquième et sixième mentions marocaines de ce Laridé néarctique toujours très accidentel au Maroc. Toutes ont eu lieu assez au sud le long de la côte Atlantique, des Haha au nord d'Agadir à la Saquiat Al-Hamra, dont trois à l'embouchure du Souss.

Il y a une observation en Mauritanie et plusieurs au Sénégal (Isenmann *et al.* 2010).

Goéland à bec cerclé – Ring-billed Gull *Larus delawarensis* AV (22/22, 21/27, 1/1)

2011 (11/08) Plaines du Maroc oriental, Melilla, oiseau de premier hiver, photos, 17 février-16 mars (D. Jerez Abad & R. Ramírez Espinar)

Première donnée de ce néarctique accidentel au Maroc à être homologuée sur la côte méditerranéenne.