

Observation d'un Pluvier fauve *Pluvialis fulva* près de Tnine Al Gharbiya (Province de Sidi Bennour)

Abdeslam RIHANE^(1, 2 & 3) et Rhimou El HAMOUMI^(2 & 3)

⁽¹⁾ Département des Sciences de la Vie et de la Terre, Centre Régional des Métiers de l'Éducation et la Formation (CRMEF) Casablanca-Settat – Casablanca (Maroc)
abdeslam.rihane@gmail.com

⁽²⁾ Laboratoire d'Écologie et d'Environnement, Faculté des Sciences Ben M'sik, Université Hassan II – Casablanca (Maroc)

⁽³⁾ GREPOM-BirdLife, Résidence Oum Hani 3, Avenue Ouali Al Had Sidi Mohamed – Salé (Maroc)

Disponible en ligne (Available online) : 16 décembre 2019

Introduction

Le Pluvier fauve *Pluvialis fulva* se reproduit dans les hautes latitudes russes et l'ouest de l'Alaska ; il hiverne de l'Afrique de l'Est à l'Océanie, l'Australie et la Nouvelle Zélande, et sous de plus faibles effectifs le long de la côte californienne.

L'espèce est accidentelle dans plusieurs pays ouest-européens et, dans le Maghreb, a été observée en Tunisie (Aye & Roth 2001) et en Algérie (Heim de Balsac & Mayaud 1962). Elle n'apparaît pas sur la liste des oiseaux du Maroc (Bergier *et al.* 2017).



Figure 1. Répartition du Pluvier fauve *Pluvialis fulva* (Birdlife International 2019)

La station d'observation

La daya de Tarasghoul (32°37'47"N 08°47'04"W, connue également sous le nom de lagune de Khemis Zemamra) est située près du village de Tnine Al Gharbiya dans la plaine des Doukkala, province de Sidi Bennour, à 26 km à vol d'oiseau du site ornithologique bien connu de Oualidia sur la côte atlantique (Fig. 2).




Figure 2. Localisation de la région de Tnine Al Gharbiya (★)




Figure 3. Carte détaillée

Cette daya est une dépression peu profonde (max. 50 cm d'eau). La surface totale de mise en eau est d'environ 94 ha, le périmètre de 4200 m. La mise en eau se fait naturellement par les eaux de ruissellement durant la période pluvieuse, artificiellement par les eaux de drainage des champs irrigués et par celles issues de la station d'épuration installée sur sa rive nord (d'où son autre nom de Daya Es'safaya = daya filtre). Son eau est utilisée pour l'irrigation des champs alentours – plus d'une demi-douzaine de pompes peuvent être opérationnelles ; la daya sert aussi d'abreuvoir pour le bétail et de lieu de lavage de la laine et de couvertures. Elle est propriété de l'état. Ses bordures sont utilisées pour se débarrasser des cadavres de bétail, ce qui attire beaucoup de chiens ; d'accessibilité facile, l'avifaune est souvent dérangée par les enfants des habitations proches.



Figure 4. Daya de Tarasghoul (image Google Earth du 26 avril 2016)

Observation du Pluvier fauve

Le 5 juin 2016, nous observons un pluvier solitaire accompagnant quelques limicoles : Grands Gravelots, Gravelots à collier interrompu, Bécasseaux variables, Glaréoles à collier et Echasses blanches. L'oiseau, en plumage nuptial, paraît semblable à un Pluvier doré *Pluvialis apricaria* ou à un Pluvier bronzé *Pluvialis dominica*.

Mais rapidement la posture de l'oiseau, très haut sur pattes, et la couleur du dessous des ailes, gris brun, nous firent écarter le Pluvier doré et nous firent penser à un Pluvier fauve ou à un Pluvier bronzé.

Une analyse ultérieure des photos prises sur le terrain, malgré les conditions météorologiques défavorables, nous permit de conclure qu'il s'agissait d'un pluvier fauve.

Les éléments distinctifs de ce pluvier (visibles sur les photos de la figure 5) sont :

- ① - Front : blanc large
- ② - bec : le bec paraît nettement long et épais
- ③ - Flanc : barré de noir
- ④ - Indentations sur les rémiges : grandes
- ⑤ - Sous-caudales : présence de taches noires,
- ⑥ - Tibias : paraissent très longs
- ⑦ - Dessous des ailes : gris.




Figure 5. Pluvier fauve *Pluvialis fulva*. Daya de Tarasghoul, 5 juin 2016

Cette observation ajoute une espèce à la liste des oiseaux du Maroc :

Scientific name	Nom français, nom anglais	Nom arabe	Statut
<i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier fauve, Pacific Golden Plover	قطقاط ذهبي شرقي	AV

Notons que la daya de Tarasghoul avait déjà accueilli un autre pluvier rare au Maroc, un Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* observé le 8 octobre 2016 par Benoit Maire (Fareh *et al.* 2018).

Remerciements

Tous nos remerciements à Arnoud van den Berg, Benoit Maire et Alain Mathurin pour leur analyse des photos.

Bibliographie

- Aye, R. & Roth, T. 2001. Observation d'un Pluvier fauve dans le golfe de Gabès. *Alauda* 69 : 203-204.
- Bergier, P. ; Thévenot, M. ; Rihane, A. ; El Agbani, M.A. & Qninba, A. 2017. Liste des oiseaux du Maroc. Mise à jour mai 2017 (rév. 4.0). *Go-South Bulletin* 14 : 43-68.

BirdLife International 2019. Species factsheet: *Pluvialis fulva*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 22/11/2019.

Fareh, M. ; Maire, B. ; Laïdi, K. ; Franchimont, J. & CHM. 2018. Les oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine numéro 23. *Go-South Bulletin* 15 : 25-44.







Heim de Balsac, H. & Mayaud, N. 1962. *Les Oiseaux du Nord-Ouest de l'Afrique. Distribution géographique, Ecologie, Migrations, Reproduction.* Ed. Lechevalier, Paris, 487 pp.





Pluvier fauve *Pluvialis fulva*. Daya de Tarasghoul, 5 juin 2016

Tableau I. Caractères distinctifs des Pluviers fauve, bronzé et doré

	Pluvier fauve <i>Pluvialis fulva</i>	Pluvier bronzé <i>Pluvialis dominica</i>	Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria</i>
Silhouette	Plus mince et élancé	Élancé	Parait trapu
Forme			
Taille	Petite (21-25 cm)	Similaire au Pluvier doré (24-27 cm)	Similaire au Pluvier bronzé (25-28 cm)
Dessous des ailes	Gris brun	Gris brun	Blanc
Cou	Parait long	Moins long	Moins long
Pattes au repos	Très longues	Longues	Moins longues
Pattes au vol	Dépassent la queue	Ne dépassent pas la queue	Ne dépassent pas la queue
Bec	 <i>Pluvialis fulva</i> Plus long et plus épais	 <i>Pluvialis dominica</i> Plus petit	 <i>Pluvialis apricaria</i> Moins long
Bande blanche	Étroite sur les flancs	Absente sur les flancs	Plus large sur les flancs
Motifs sur le dessus	Grossiers	Plus grossiers	Fins
Couleur du fond du dessus	Dorée et noire	Beaucoup plus de noir	Plus dorée
Indentations sur les rémiges	Larges sur fond doré	Larges sur fond sombre	Plus fines sur fond doré
Flanc	Barré de noir	Noir	Blanc
Espace entre le flanc et le croupion	Avec barres noires	Noir	Avec taches diffuses
Sous-caudales	Présence de taches noires	Noires	Blanches
Front	Plus large	Peu large	Peu large
Rémiges	Dépassent peu la queue	Dépassent nettement la queue	Dépassent à peine la queue